

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE OPIÁCEOS EN LA UNIDAD DE ONCO-HEMATOLOGÍA DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL



HERRERA CARRANZA S, ZAMORANO MÉNDEZ P, ADEVA ANTONA S, PRADA BOU M, SALVADOR LLANA I, GÓMEZ PEDRERO A M, SÁNCHEZ-ESCRIBANO CARRASCO M, PÉREZ ENCINAS M.

HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN DE ALCORCÓN. C/ BUDAPEST 1. ALCORCÓN (MADRID).

OBJETIVOS

Conocer la evolución de las dispensaciones de opiáceos durante un periodo de 8 años(2014-2021) y el perfil de los fármacos como patrón de prescripción en una unidad de oncohematología.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional y retrospectivo de serie temporal de consumo, en un hospital de tercer nivel en el que se incluyeron todas las dispensaciones de opiáceos a la unidad de oncohematología entre 2014-2021.

Variables recogidas:

- Tipo de opiáceo
- Medicamento
- Dosis
- Unidades dispensadas por año
- Precio medio
- Estancias

Medicamentos recogidos:


- Fentanilo transdérmico
- Fentanilo transmucoso liberación inmediata
- Morfina parenteral
- Morfina comprimido liberación prolongada(CLP)
- Oxycodona CLP
- Oxycodona cápsula/comprimido liberación inmediata(CLI)
- Fentanilo pulverización nasal
- Petidina parenteral
- Morfina CLI
- Oxycodona/naloxona CLP

RESULTADOS


Unidades dispensadas	59.877
Nº de dispensaciones	3.619

Coste medio anual	3.027,29 €
	2.071,68-3.444,38


Coste por principio activo:




Distribución según vía de administración



Distribución anual



Presentaciones orales porcentajes ajustados a la dosis



CONCLUSIONES

- Los datos de nuestro hospital reflejan una reducción en el consumo de opiáceos en la unidad de oncohematología, tanto en números absolutos como atendiendo a estancias y altas; lo que difiere de la evolución de las dispensaciones desde farmacia comunitaria informada por el Ministerio de Sanidad español, las cuales aumentan anualmente.
- Los principios activos más consumidos fueron la morfina, en su mayoría por vía parenteral, y el fentanilo transdérmico. Morfina CLP es el opiáceo de administración oral de mayor consumo, seguido por las presentaciones CLP de oxycodona. Se observa una tendencia generalizada de prescripción de la combinación oxycodona/naloxona a expensas de oxycodona en monoterapia, actualmente casi nula.