

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN DABRAFENIB/TRAMETINIB EN MELANOMA AVANZADO O IRRESECABLE

Cano Molina, JA · Fernández Ávila, JJ · Díaz Ramón, M · Martínez Ibáñez, MA,
· Torró García, L · Gil Almela, J · Villa Carpes, J · García Soler, JI
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)


OBJETIVOS

La introducción en los últimos años de **inhibidores de BRAF** ha supuesto un avance en el abordaje del melanoma avanzado o irreseccable en los pacientes que poseen **mutación** en el gen BRAF. El objetivo de este estudio es evaluar la **efectividad** y **seguridad** de dabrafenib/trametinib en la práctica clínica.

MATERIALES Y MÉTODOS

▪ Observacional, descriptivo, retrospectivo

▪ Variables: sexo, edad, tipo de tumor, ECOG, tratamientos previos y posteriores, media del % de reducción del valor de LDH



MARZO 2017 –
MARZO 2022

▪ **EFECTIVIDAD** { Supervivencia libre de progresión (SLP)
Supervivencia global (SG) } *Kaplan-Meier*

▪ **SEGURIDAD** → Eventos adversos (EA), reducción de dosis y/o interrupción del tratamiento } *CTCAE v. 5.0.*

RESULTADOS

♂ ♀ **n = 8**
7 ----1

Edad (mediana) = 71 [53-84] años

ECOG →

- ECOG=1 → n = 2 pacientes
- ECOG=2 → n = 5 pacientes
- ECOG=3 → n = 1 paciente

Tratamientos previos (4 pacientes)

- Vemurafenib → n = 2 pacientes
- Nivolumab → n = 1 paciente
- Pembrolizumab → n = 1 paciente

E
F
E
C
T
I
V
I
D
A
S
E
G
U
R
I
D
A
D

Mediana (rango) seguimiento = 31 (2-58) meses

Media % (rango) reducción LDH pre- y post-tratamiento
31,7 (8-62,1) %

No se alcanzó mediana de supervivencia ni para SLP ni para SG

- Progresión (n=3 pacientes)
- Exitus (n=2 pacientes)

Eventos Adversos (EA)

n = 6 pacientes

Grados 1 -3

- n = 2 pacientes inician dosis **reducidas** (comorbilidades)
- n = 4 pacientes **reducción** dosis por EA
- n = 4 pacientes **suspenden** tratamiento → 1 **reanuda** y tolera

- Toxicidad cutánea (n=5)
- Fiebre (n=4)
- Astenia (n=3)
- Neumonitis (n=1)
- Toxicidad hepática (n=1)
- Trombocitopenia (n=1)

CONCLUSIONES

✓ La incorporación de dabrafenib/trametinib ha supuesto una nueva opción terapéutica en pacientes que carecían de otro tratamiento, pero al tratarse de una **muestra muy pequeña** tenemos la principal **limitación** de que los datos de supervivencia no nos informan hasta el momento sobre la **efectividad**, ni por tanto podemos comparar adecuadamente con los ensayos clínicos de referencia.

✓ En general, son tratamientos **seguros** a pesar de los **eventos adversos** que pudieran suceder, pues en casi todos los casos se han tratado de forma **ambulatoria** y/o con **reducciones de dosis**.

